

MODO DE EMPLEO

En el colmenar, necesitará:


- ✓ Agua tibia (30 - 35°C)
- ✓ Ropa de protección (guantes resistentes al ácido y gafas de seguridad)
- ✓ Una jeringa con un tubo de plástico flexible o una pistola de remojo

Puntos clave para un tratamiento eficaz:

- ✓ **Oxybee se aplicará solo en colonias libres de cría**, ya sea mediante una parada de cría natural (invierno o temperaturas muy altas en verano) o mediante una parada de cría artificial (enjaulamiento de reina, eliminación completa de la cría, división de colonias).
- ✓ La temperatura externa durante el tratamiento con Oxybee debe ser superior a 3°C.
- ✓ Úselo en colmenas con cuadros verticales accesibles desde arriba.
- ✓ No exceda la dosis recomendada (54 mL por colonia) y respete la posología (5-6 mL por espacio ocupado por abejas).


Preparación:

1. Abra la caja y escriba la fecha de apertura en la botella y en el embalaje.
2. Antes de la aplicación se debe mezclar la solución de ácido oxálico con el contenido de los 2 sobres de la siguiente manera:
 1. Ponga la botella de solución de ácido oxálico dihidratado en agua tibia (30 - 35°C) para calentar el líquido.
 2. Abra las dos bolsitas de sacarosa en polvo con tijeras y vierta el contenido completo (2 bolsitas) en la botella con la solución de ácido oxálico dihidratado.
¡Un embudo puede ser útil!
3. Cierre bien la botella y agítela hasta que el polvo se disuelva totalmente.



Cómo utilizar Oxybee:

- ✓ Abra la colmena y elimine los puentes de cera para que pueda ver fácilmente las abejas y alcanzarlas con el producto.
- ✓ Agite bien la botella antes de usarla, especialmente si la guardó en la nevera para un uso posterior. Colóquelo en un recipiente de agua tibia (30 - 35°C) para calentarlo antes de usarlo.
- ✓ Use una jeringa con un tubo de plástico romo o una pistola para aplicar la solución.
- ✓ Administrar 5-6 ml de la solución lista para usar por espacio de abeja ocupado. No exceda los 54 ml por colonia.



Goteo de Oxybee con la ayuda de una jeringa



La solución líquida solo debe aplicarse entre los cuadros donde están presentes las abejas.

Oxybee puede guardarse un año en la nevera tras la mezcla:

Antes de la mezcla: La vida útil de Oxybee en el paquete de venta es de dos años después de la fecha de fabricación.



Después de la mezcla: La solución lista para usar se puede almacenar durante un año en la nevera (2 - 8°C).

Agite bien la botella antes de cada uso. También le recomendamos que coloque la botella en un recipiente de agua tibia (30 - 35°C) para calentar la solución y hacerla más agradable para las abejas cuando gotee.

www.veto-pharma.es

Véto-pharma Ibérica S.L. - Paseo de la Castellana, 153 bajo, 28046 Madrid - España
Tel : +34 91 663 85 78 - info@vetopharma.com

Distribuido por:

Véto-pharma
ibérica

OXYBEE polvo y solución de 39,4 mg / ml de dispersión para colmenas. Indicaciones para su uso: Tratamiento de varroasis (Varroa destructor) de las abejas melíferas (Apis mellifera) en colonias sin cría. **Contraindicaciones:** ninguna. **Tiempo de espera: Miel:** cero días. No usar cuando haya cuadros con miel. Lea cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta del producto antes de usar. **Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario:** Este medicamento veterinario es muy ácido y puede tener efectos irritantes y corrosivos en la piel, los ojos y las membranas mucosas. Evite la exposición oral, incluido el contacto de mano a boca. Evite el contacto directo con la piel y los ojos, así como el contacto mano a ojo. Se debe usar un equipo de protección personal consistente en ropa de protección, guantes a prueba de ácidos y gafas de seguridad. Lávese las manos y la piel expuesta inmediatamente con jabón y agua abundante. No coma, beba ni fume mientras manipule y aplique el medicamento veterinario. Quítese la ropa contaminada inmediatamente. Los dispositivos de medición usados y los envases vacíos deben desecharse inmediatamente de manera adecuada. En caso de ingestión accidental, lave la boca con agua y beba agua o leche, pero no induzca el vómito. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua (primero quite las lentes de contacto). Busque atención médica inmediatamente y muestre el prospecto o la etiqueta. **Por favor, consulte a su veterinario, farmacéutico u organización sanitaria. En caso de persistencia de los síntomas, consulte con su veterinario. Uso Veterinario. Titular de la Autorización de Comercialización: Dany Bienenwohl GmbH, Geyerspergerstr.27, 80689 München, Deutschland**